

غذا و دارو

شماره ۲ - مرداد ماه ۹۴

بررسی پرونده نظام پزشکی: تحویل ۱۰ آمپول تریامسینولون به جای

کپسول تامسولوسین

اندیکاسیون های احتمالی تجویز داروی تامسولوسین:

هیپرتروفی خوش خیم پروستات
وجود سنگ در میزنای چپ و مجاری ادراری
علائم ناشی از انسداد مجاری ادراری

- شکل دارویی تامسولوسین هگزال:

کپسول ۰.۴ میلی گرمی است که بسته بندی در بلیسترهای ۱۰ تایی
است. (نام تجاری: flomax)

موارد و مقدار مصرف: Tamsulosin Hexal® درمان کننده
هیپریلازی خوش خیم پروستات (BPH) میباشد. این دارو از راه
خوراکی و به میزان ۰/۴ میلی گرم یک بار در روز و نیم ساعت پس از
غذا تجویز می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ درمانی مطلوب بعد
از ۲ الی ۴ هفته، می توان دوز مصرفی را به ۰/۸ میلی گرم در روز
افزایش داد. اگر وقفه ای در مصرف دارو به وجود آمد، شروع درمان
مجدداً میبایست با دوز ۰/۴ میلی گرم باشد.

موارد احتمالی اشتباه در نسخه خوانی:

- نام تجاری دارو (flomax) می تواند با نام تجاری داروی اندرونات
(fosamax) اشتباه نسخه پیچی شود.

**- در این مورد نام دارو به علت تشابه کارخانه سازنده و دوز
دارو با داروی تریامسینولون هگزال ۴۰ میلی گرم اشتباه گردیده
است:**

- شکل دارویی آمپول تریام هگزال ویال های ۴۰ میلی گرمی است.
از TriamHexal® در درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی
استفاده می شود. این دارو همچنین در درمان علامتی اختلالات التهابی
و آلرژیک، بیماری های تنفسی مانند آسم و COPD و برای سرکوب
سیستم ایمنی در بیماری های روماتیسمی کاربرد دارد. در بزرگسالان
به صورت داخل مفصلی با تزریق در غلاف تاندونی به میزان ۲/۵ الی

۱۵ میلی گرم، و به صورت تزریق زیر پوستی یا داخل ضایعه تا ۱ میلی
لیتر در هر ناحیه تزریق تجویز می گردد. در صورت نیاز این میزان می
تواند بعد از یک هفته آن را تکرار نمود. میزان تزریق داخل عضلانی ۴۰
الی ۸۰ میلی گرم بوده و در صورت لزوم ممکن است بعد از ۴ هفته
تکرار شود.

- عوارض ناشی از عدم تحویل داروی تامسولوسین به بیمار:

با توجه به اینکه پزشک با تجویز دوره ی کوتاه مدت ، هدف بررسی
روند درمانی و تجویز دوز درمانی مناسب را مدنظر دارد، در صورت
عدم رسیدن دارو به بدن بیمار علائم بهبودی مشاهده نخواهد شد و
پزشک به اشتباه تصمیم به تغییر دارو یا استفاده از دوز های بالاتر
جهت درمان بیمار خواهد گرفت.

در مورد فردی که دچار احتباس ادراری یا سنگ میزنای شده باعث
بدتر شدن علائم بالینی بیمار خواهد شد.

- عوارض ناشی از تحویل و مصرف داروی اشتباه:

عوارض ناخواسته و حاد دارو:

CNS: سرخوشی ، سردرد ، عصبانیت بی خوابی ، بی قراری و
اختلالات روانی

Derm: آکنه ، راش و...

EENT: کاتاراکت ، گلوکوم و پرفک

Metabolic: هیپرگلیسمی ، احتباس مایع و سدیم

- از دیگر عوارض : افزایش استعداد ابتلا به عفونت و نهفته کردن
علائم عفونت ، ترومبوفلیت ، هایپرتانسیون و آتروفی عضله و
هیرسوتیسم و عوارض مزمن من جمله :استئوپورز و هایپوکالمی و ...
- تداخلات دارویی:

گلوکوکورتیکوئید ها با بسیاری داروها تداخل مصرف دارند از جمله:

- انسولین: در افراد دیابتی که گلوکوکورتیکوئید مصرف می کنند دوز
انسولین مصرفی کفایت لازم برای کاهش قند خون را ندارد از طرفی
میزان نیاز به انسولین غیر قابل تخمین خواهد بود ، و نیاز به تعدیل
دوز دارد.

استفاده همزمان از TriamHexal® به همراه آموکوتریسین B، مهار
کننده های آنزیم کرینیک آنهیدراز، آنتی اسیدها، داروهای ضد دیابت،
انسولین، گلیکوزیدهای دیژیتالی، دیورتیک ها، القاء کننده های آنزیم
های کبدی، ریتودرین، غذاها و یا داروهای حاوی سدیم، سوماترم
وسوماتروپین و واکسن های حاوی ویروس های زنده باعث ایجاد
تداخلات دارویی میگردد.